


메르스 바로 알기

메르스란?



신종 코로나바이러스
(MERS-CoV)에 의한
급성호흡기질환을
말합니다.



감염경로

1 증상



2 잠복기

2~14일 정도로 추정

1 낙타와 접촉

2 환자와 직접접촉 하거나 같은 공간에 머문 경우

※ 입점접속자는?

적절한 개인보호장비(가운, 장갑, N95 마스크, 눈 보호장비
(고글이나 안면보호구))를 착용하지 않고

- 환자의 3M 이내에서 머문 경우
- 같은 방 또는 진료/처치/병실에 머문 경우(가운, 보건복합인 등)
- 환자의 호흡기 분비물과 직접 접촉한 경우

메르스 바로 알기

감염 증상 신고

1 메르스 의심환자란?

1. 발열과 폐렴증상이 있는데 14일 이내 중동 지역 방문
2. 14일 이내 중동을 다녀와서 발열과 폐렴이 있는 사람과 밀접하게 접촉
3. 발열과 호흡기 증상(기침, 호흡곤란)이 있으면서
14일 이내에 중동 지역 의료기관 근무 또는 방문
4. 발열 또는 호흡기 증상이 있으면서 메르스 확진 환자와 밀접 접촉

2 메르스 발생국가는?



사우디아라비아, 쿠웨이트, 카타르, 아랍에미리트,
요만, 예멘, 요르단 등(2015년 기준)

생활 속 예방 수칙



물과 비누로 자주 손씻기



씻지 않은 손으로 눈, 코, 입을 만지지 않기



기침, 재채기 시 휴지로 입과 코를 가리고,
휴지는 반드시 쓰레기통에 버리기



발열이나 호흡기 증상이 있는 사람과
접촉을 피하기



중동 지역 여행 시에는 낙타와 접촉을 피할 것



메르스 의심환자는 본인과 가족, 다른 국민을 위해
메르스 핫라인 043-719-7777로 꼭 신고해 주세요

붙임

메르스, 꼭 알아야 할 10가지

1. **(정의)** 메르스는 중동에서 발생한 급성 호흡기 감염병으로 신종 코로나 바이러스가 원인입니다.
2. **(증상)** 발열, 기침, 호흡곤란 등 일반적인 호흡기 증상 외에도 메스꺼움, 구토, 설사 등이 있을 수 있습니다
3. **(전염)** 증상은 감염 후 최소 2일에서 14일 사이에 나타나며, 증상이 나타나기 전에는 전염력이 없는 것으로 알려져 있습니다.
4. **(전파)** 일반적으로 2m 이내에서 기침, 재채기를 할 경우 나오는 분비물로 전파됩니다.
5. **(예방)** 자주 비누로 손을 씻고, 씻지 않은 손으로는 눈, 코, 입을 만지지 않아야 하며, 기침할 때는 입과 코를 휴지로 가리고, 발열이나 기침이 있는 사람과는 접촉을 피하여야 합니다.
6. **(자가격리)** 환자와 밀접한 접촉을 한 경우, 증상이 없더라도 보건소에 연락하고 가족과 주변사람을 위해 접촉일로부터 14일간 자가 격리를 해야 합니다.
7. **(진료)** 환자와 밀접 접촉을 하였거나, 중동지역을 방문한 후 14일 이내에 메르스 의심 증상이 있으면 의사의 진료를 받아야 합니다.
8. **(진단)** 메르스는 가래, 기관지 세척액의 유전자를 검사(RT-PCR)하여 진단합니다.
9. **(치료)** 환자는 증상에 따른 치료를 받게 되며, 중증의 경우에는 인공호흡기, 혈액투석 등 집중 치료를 받습니다.
* 증상과 발열이 48시간 이상 없고, 유전자검사 결과가 24시간 간격으로 2회 음성인 경우 퇴원
10. **(장비)** 의료진은 손씻기, 일회용 가운과 장갑, N95 마스크, 눈보호 장비를 갖추어야 합니다.